



# Antigua anole

Slægt: Anolis  
Art: Anolis leachii  
Levealder: 8 – 12 år

---

## Levesteder

Anolis leachii lever på de caribiske øer Antigua og Barbuda, hvor den bor i varme, fugtige kystskove, krat og lysåbne skovkanter. Vegetationen består af lave til mellemstore træer, klatreplanter og tætte buske, som giver gode siddepladser i sol og halvskygge. Klimaet er stabilt tropisk med varme dage, hyppige regnbyger og konstant høj luftfugtighed. Arten ses ofte på grene i 1–4 meters højde, hvor den udnytter både lyse udsigtspunkter og tætte skjul. De mange forskellige klimaer på øerne gør det muligt for dyrene at regulere sig præcist mellem varme, lys og fugt.

---

## Fakta

Det er en relativt stor anole på 20–25 cm, kendt for sin kraftige kropsbygning, lysegrønne farve og karakteristiske blå eller turkise hoved- og halstegn. Hannen har en markant strube-sæk i gule eller dæmpede nuancer, som bruges i territorievkning og parringsadfærd. Arten lever primært af små insekter, edderkopper og lejlighedsvis bløde plantedele. Den er dagaktiv, hurtig og ofte synlig, men kan blive sky ved gentagne forstyrrelser. Hanner er territoriale og bør ikke holdes sammen. Arten trives i stabile terrariemiljøer med varme, højde og rig struktur.

---

## Terrariet

Et højt terrarie på minimum 60×45×90 cm giver gode forhold til et par. Indretningen skal efterligne tropisk kystskov med mange klatremuligheder, solområder og skjulte vilde zoner. Brug robuste planter som Epipremnum aureum, Ficus benjamina, Schefflera arboricola, Philodendron scandens, Dracaena, Hoya-arter og større bregner for at skabe højde, tæt løv og fugtige mikrohabitater. Tilføj tykke og mellemtykke grene i forskellige retninger, så anolerne kan bevæge sig frit mellem udsigtspladser og skyggeområder. En korkbagvæg giver stabile klatrepunkter og udnytter terrariet højde. Underlaget bør være en blanding af kokos humus, bark, jord og mos, som skaber et naturlige forhold. Terrariet skal være tæt beplantet i sider og midte, men med åbne zoner, hvor dyrene kan solbade og jage. Ventilationen skal være god, men uden at udtørre terrariet, så både varme og fugt forbliver stabile. Flere skjul i både top og midte reducerer stress og giver gode tilbagetrækningsmuligheder.

---

## Vand & foder

Anolen drikker hovedsageligt fra dråber efter forstøvning, så daglig forstøvning er en afgørende. En lille lav vandskål kan dog tilbydes. Foderet kan bestå af små til mellemstore insekter: fårekylinger, små kakerlakker, græshopper, sorte soldaterlarver, bananfluer og voksmøllarver som sjælden godbid. Variation er vigtig for at opretholde sundhed. Calcium bør gives ved næsten hver fodring, og multivitamin 1–2 gange ugentligt. Fodring bør ske i de lyse timer, hvor anolerne er mest aktive og jager naturligt.

---

## Lys, varme & fugt

Arten kræver et velbelyst terrarie og UVB for korrekt vitamin- og mineralbalance. Temperaturen i terrariet skal ligge på 24–26°C med en solplads på 30–32°C. Nattetemperaturen kan falde til 20–22°C. Luftfugtigheden holdes på 60–70% med naturlige udsving i løbet af dagen. Morgen- og aftenforstøvning kan øge aktiviteten og efterligner øernes naturlige fugt. Terrariet skal have både gode lyszoner og tætte, skyggefulde områder. Luftcirkulationen skal være stabil uden at skabe udtørrende træk.

---

## Aktivitet

Anolen er meget aktiv i dagslys og bevæger sig hurtigt mellem høje grene og blade. Den soler sig ofte om morgenen og patruljerer derefter sit territorium. Hanner udviser tydelige visuelle signaler som hovednik, strube-sæk fremvisning og korte jagter. Gruppen fungerer bedst med én han og flere hunner i et stort, tæt beplantet terrarie. Aktiviteten øges markant i miljøer med mange klatreruter, åbne solområder og rolige, naturlige skjul.