



Pacman frø (Cranwells hornfrø)

Slægt: Ceratophrys
Art: Ceratophrys cranwelli
Levealder: 6-10 år

Levesteder

Pacman frøen stammer fra de fugtige områder i Sydamerika, især i lande som Brasilien, Argentina og Uruguay. De lever ofte i regnskove eller græsarealer med høj luftfugtighed og rigelig vegetation. Frøen tilbringer det meste af sit liv nedgravet i jorden og venter på bytte.

Fakta

Pacman frøen har fået sit navn fra sin store, runde krop og brede mund, der minder om spilfiguren Pac-Man. Den er kendt for sin aggressive jagtstil, hvor den sluger byttet i én bid. Frøen kan blive op til 10-15 cm lang og veje op til 0,5 kg.

Frøen har en imponerende appetit og kan spise bytte næsten lige så stort som den selv. På trods af sit rolige udseende kan den være hurtig og præcis, når den angriber. Pacman frøen har ikke tænder, men dens skarpe kæbekanter bruges til at fastholde byttet.

Terrariet

Terrariet bør være mindst 45x45x45 cm (L x B x H) for én frø. Det anbefales at indrette terrariet med naturlige materialer som planter, barkstykker og skjulesteder for at efterligne dens naturlige miljø. En lav, bred skål til vand bør placeres i den kølige ende af terrariet.

Bundlaget kan bestå af fugtig kokosfiber, spagnum eller andet substrat, der kan holde på fugt og tillader frøen at grave. Laget bør være mindst 5-10 cm dybt. Det er vigtigt at sikre, at skjulesteder er stabile, så de ikke kollapser, når frøen graver.

Dekorationer som grene og blade kan tilføjes for at skabe et miljø, der både er visuelt tiltalende og stimulerende for frøen. Sørg også for at undgå skarpe kanter, der kan skade den.

Vand & foder

Pacman frøen skal altid have adgang til en lav vandskål, som er stor nok til, at den kan sidde i den. Vandet skal være rent og det bør udskiftes dagligt for at undgå bakterievækst.

Frøens kost består af levende bytte som insekter (græshopper, fårekylinger, og kakerlakker), regnorme og lejlighedsvis små gnavere. Unger fodres dagligt, mens voksne fodres 2-3 gange om ugen. For optimal ernæring bør foderet drysses med kalk og vitaminpulver ved hver fodring.

Variation i kosten er vigtig. Overfodring bør undgås, da Pacman frøer let kan blive overvægtige.

Lys, varme & fugt

Selvom Pacman frøen ikke har et stort behov for UVB-lys, anbefales det altid at tilbyde UVB, da det kan understøtte en sund calcium optagele. UVB-lys kan også bidrage til et naturligt lysmønster i terrariet.

Temperaturen i terrariet bør ligge på 24-27 grader i dagtimerne og må falde til 20-22 grader om natten.

Luftfugtigheden skal holdes på 60-80%. Dette kan opnås ved regelmæssig forstøvning af terrariet, især om morgenen og aftenen.

Aktivitet

Pacman frøen er overvejende inaktiv og tilbringer størstedelen af sin tid i ro. Den er primært aktiv om natten, hvor den jager sit bytte. Den kan også være aktiv kortvarigt i dagtimerne, især ved fodring eller hvis omgivelserne forstyrres.