



Grøn anole

Slægt: Anolis
Art: Anolis carolinensis
Levealder: 5 – 8 år

Levesteder

Anolis carolinensis lever blandt andet i store dele af det sydøstlige USA, Hawaii og forskellige øer i Stillehavet, hvor den findes i fugtige, varme habitater som skovkanter, sumpskove, krat, haver og træfyldte byområder. Den udnytter især lav og mellem-høj vegetation, hvor solpletter, skjulesteder og gode udsigter til jagt er let tilgængelige. Klimaet i udbredelsesområdet er præget af varme somre, milde vintre, høj fugtighed og hyppige regnbyger. De fleste dyr skifter hyppigt mellem sol og skygge for at regulere temperaturen.

Fakta

Det er en dagaktiv, slank anole på 15–20 cm, hvor halen udgør en stor del af længden. Den kan skifte farve mellem grøn og brun, afhængigt af temperatur, stressniveau, social adfærd og baggrund. Hannerne har en markant lyserød strube-sæk, som bruges ved territorievisning, trusler og parringskald. Arten lever af små insekter og reagerer kraftigt på bevægelse, hvilket gør den til en aktiv jæger. Den er adræt, let og hurtig til at søge skjul. Den er følsom overfor kulde, stress og dårlig luftcirkulation.

Terrariet

Et højt terrarie på mindst 60×45×60 cm anbefales til et par. Arten udnytter primært den midterste til øverste del af terrariet, så højden er vigtigere end bundareal. Indretningen skal være tæt, grøn og fyldt med klatreelementer, der giver både visuel afskærmning og sikre hvilepladser. Brug planter som Epipremnum aureum, Philodendron scandens, Ficus pumila, Schefflera arboricola, Dracaena, Hoya og forskellige bregner for at skabe en varieret, fugtighedsbevarende struktur. Bromeliader fungerer som naturlige opsamlere af dråber og giver gode siddepladser.

Tilføj et rigt netværk af grene i tynde og mellemtykkede størrelser, bambus, korkrør, reb og diagonale klatreruter, så dyrene let kan bevæge sig mellem sol- og skyggezoner. En struktureret bagvæg giver ekstra siddepladser og øger tryktheden, da dyrene kan trække sig halvt skjult, men stadig have udsigt. Underlaget bør være en fugtbevarende blanding af kokos humus, jord, bark og blade, der holder fugten uden at blive sumpet. Terrariet skal have god ventilation for at undgå stagnation, men fugten må ikke forsvinde for hurtigt.

Vand & foder

Arten drikker primært fra vanddråber på bladene efter forstøvning, så daglig forstøvning er nødvendig. En lille lav vandskål kan inkluderes som supplement. Foderet bør bestå af små levende insekter som fårekylinger, små kakerlakker, græshopper, bananfluer og voksmøllarver som sjældent godbid. Variationen skal være høj. Calcium gives ved de fleste fodringer, mens multivitamin gives 1–2 gange ugentligt. Fodring sker bedst om morgenen og formiddagen, hvor dyrene er mest aktive og jagtlystne.

Lys, varme & fugt

Anolen kræver kraftigt lys og UVB for korrekt stofskifte og naturlig adfærd. Temperaturen bør ligge på 24–26°C med en solplads på 30–32°C. Nattemperaturen kan falde til 20–22°C. Fugtigheden skal være 60–70% med naturlige udsving i løbet af dagen gennem forstøvning, hvor fugten topper om morgenen og falder moderat i løbet af dagen. Terrariet skal have både klare, varme lyszoner og tætte skyggeområder. Luftcirkulation skal være stabil, men uden at skabe udtørring eller kolde træk.

Aktivitet

Arten er meget aktiv i dagslys, hvor den patruljerer terrariet, jager og søger efter varme- og hvilepladser. Hanner kan vise tydelige territoriebevægelser som hovednik, strube-sæk-udfoldelse og kortvarige jagter. Aktiviteten stiger markant i et levende indrettet terrarie med mange klatreruter, grønne zoner og naturlige skjul. Dyrene er nysgerrige, men bliver let stressede af hyppig håndtering og hurtige bevægelser.