Grønt græsfirben

Slægt: Takydromus
Art: Takydromus smaragdinus
Levealder: 5 – 8 år

Levesteder

Takydromus smaragdinus findes i Japan og er udbredt på øerne Honshu, Shikoku og Kyushu, hvor den lever i lavlandsområder tæt på kysten og i fugtige dale. Den forekommer især i områder mellem åbne lysninger og lav skov, hvor græs og buske danner tæt krat. Miljøet er præget af et fugtigt tempereret klima med markante årstider: varme, regnfulde somre og kølige vintre med svingende temperaturer. Vegetationen giver høje, fleksible stængler og blade, som fungerer som skjul og klatreflader. Små vandløb og fugtige lavninger i terrænet bidrager til stabile klimaer og tiltrækker rigeligt med insekter.

Fakta

Det er en smaragdfarvet græsfirben art, der typisk bliver 18–25 cm i alt, hvor halen kan udgøre op til 70% af længden. Den klare, grønne kropsfarve fungerer som effektiv camouflage mellem friske blade og stængler, og farvenuancen kan variere let med årstid og individ. Arten har fremragende syn og bruger hurtige, præcise bevægelser til at fange små insekter i bevægelse. Hanner kan udvikle svage farveforstærkninger i parringssæsonen og udfører små visuelle markeringer i form af kropsløft. Arten er kendt for sin evne til at lave elegante spring mellem strå og stængler, hvor halen bruges som balancepunkt og retningsstyring.

Terrariet

Et terrarie på minimum 60×45×60 cm anbefales til en lille gruppe. Indretningen skal efterligne fugtige, tætte græs- og buskhabitater. Planter med lange, smalle blade er særligt velegnede, såsom Cyperus, Carex, Acorus, samt Dracaena marginata og Aspidistra for højde. Tætte blade som guldranke, Ficus pumila, Philodendron scandens og små bregner giver skjul, klatreruter og udsigtspunkter.
Tilføj et varieret netværk af tynde grene, bambus, korkrør, tørrede græsbundter og skrå klatreruter, så dyrene kan bevæge sig frit mellem niveauer. Brede blade i lysområder fungerer som solpladser, mens tæt beplantning giver tryghed. Underlaget bør være en fugtbevarende blanding af kokos humus, jord, bark og blade, der holder fugt uden at blive mudret. En struktureret bagvæg giver ekstra klatremuligheder og skaber flere flugtruter, hvilket reducerer stress. Flere skjul i både bund, midte og top gør gruppehold mere stabilt og øger aktiviteten.

Vand & foder

Arten drikker primært fra blade efter forstøvning, så regelmæssig forstøvning er nødvendig. En lav vandskål bør dog inkluderes som supplement. Foderet bør bestå af små levende insekter som fårekyllinger, små kakerlakker, græshopper, bananfluer og voksmøllarver som godbidder. Variation er vigtig for sundhed. Foderet vendes i calcium og gives ved de fleste fodringer, mens multivitamin bruges 1–2 gange ugentligt. Dyrene er aktive jægere og trives bedst med livligt, varieret bytte fremfor stillestående foder.

Lys, varme & fugt

Et godt belyst terrarie, gerne med UVB, er en god ide for at sikre korrekt optag af D3-vitamin og naturlig aktivitet. Temperaturen bør ligge på 23–25°C med en solplads på 30–32°C. Nattetemperaturen kan falde til 18–20°C. Fugtigheden bør holdes på 60–80%, med højere niveauer om morgenen og delvis udtørring midt på dagen. Terrariet skal have både solrige åbne zoner og tætte, skyggefulde områder. Luftcirkulationen skal være god, men uden at fjerne fugten for hurtigt.

Aktivitet

T. smaragdinus er meget aktiv og nysgerrig art i dagslys og bevæger sig hurtigt mellem græs, blade og klatrestrukturer. Den soler sig i de tidlige timer og jager derefter aktivt. Gruppen kan fungere harmonisk ved god plads, mange visuelle barrierer og rigelige skjul. Hanner kan vise mild rivalisering, men alvorlig aggression er sjælden. Aktiviteten øges markant i et terrarie med tæt, levende vegetation og mange ruter gennem planter og grene.

Skrevet af: Mia Højbjerg Eriksen & Anders Højbjerg Eriksen