



Korthovedet flyvepungegern (sugar glider)

Slægt: Petaurus
Art: Petaurus breviceps
Levealder: 7 – 14 år

Levesteder

Korthovedet flyvepungegern, eller sugar gliders som de kaldes i daglig tale, lever i Australien, Tasmanien og New Guinea, hvor de bebor eukalyptusdominerede skove, subtropiske regnskove og tørre skovområder. De opholder sig primært i træer, hvor de glider mellem grenene ved hjælp af deres hudfold. Levestederne har varme somre, milde vintre og moderat til høj luftfugtighed. De yngler ofte i grupper og vælger hule træer som permanente hvilesteder. Natten er deres primære aktive periode, hvor de søger føde højt i trækroneerne.

Fakta

Petaurus breviceps er en lille pungdyrart, der vejer 90–150 g og kan glide op til 45 meter mellem træer. Sukkerglidere har en imponerende glidehud (patagium), som strækker sig fra håndled til ankel og gør dem i stand til at styre retning og fart i luften. Den danner stærke sociale bånd og lever i kolonier på 4–12 individer. De markerer både territorium og hinanden med duftkirtler og er derfor meget afhængige af sociale interaktioner. Arten har en varieret kost bestående af safter, nektar, insekter og plantemateriale. De er nataktive, meget aktive og har brug for mental stimulering. I fangenskab kræver de ofte mindst to artsfæller for at undgå stress.

Bur

Flyvepungegern kræver et meget stort, højt bur, da de er glidende og klatrende dyr. Et minimum for et par er 100×100×200 cm (LxBxH), men større anbefales kraftigt for at dyrene kan udnytte deres fulde potentiale med at svæve. Buret skal være højt og fyldt med grene, lianer, reb og platforme, så de kan klatre og glide. Indsæt flere soveposer/reder af fleece eller hule reder placeret højt. Bunden kan dækkes med sand, jord, barkflis eller træpiller. Sørg for, at tremmeafstanden ikke overstiger 1,5 cm, og endnu mindre hvis der avles. Berigelse som aktivitetslegetøj, hule stammer, løbehjul og forskellige foder metoder er stærkt anbefalet.

Vand & foder

Flyvepungegern skal have friskt vand i flasker eller tunge skåle, der ikke kan vælte. Deres kost skal bestå af en kombination af proteinkilder (insekter, kød, hårdkogte æg, særlige typer glider-mix), frisk frugt i små mængder, grønt, nektarblandinger samt kommercielle glider-fodermix. Insekter som melorme og dubiakakerlakker gives som supplement, ikke basisfoder. Deres foder skal bestå af omkring 50% protein, 25% frugt og 25% grønt. Foder skal gives om aftenen, når dyrene vågner. Det er vigtigt at undgå fedme ved at holde sukkerindholdet lavt og proteinniveauet stabilt.

Lys, varme & fugt

Sukkerglidere kræver ikke UVB, men blid døgnrytme-belysning anbefales, helst dæmpet LED-lys. Temperaturen skal holdes mellem 20–25°C og må aldrig falde under 18°C. Luftfugtigheden bør ligge på 40–60%. Varme kan gives via keramiske varmelamper på ydersiden af volieren eller varme i rummet. Direkte varme i volieren skal undgås, da de let overophedes. Sørg for god ventilation uden træk.

Aktivitet

Sukkerglidere er yderst aktive og sociale, og de bruger natten på at klatre, svæve, udforske og pleje hinanden. De kræver masser af stimulering, variation og plads for at undgå dominerende adfærd. De er meget vokale og kommunikerer med kliklyde, gøen og høje kald. De bruger hele anlæggets højde og svæver mellem grenene, hvis opsætningen tillader det.