



Langhalet firben

Slægt: Takydromus
Art: Takydromus sexlineatus
Levealder: 5 – 8 år

Levesteder

Takydromus sexlineatus forekommer i store dele af Sydøstasien, hvor den lever i overgangszoner mellem fugtige græsarealer og lave buskformationer. Den er særligt knyttet til områder med stabile solåbninger, hvor lys når helt ned til jorden og skaber varme mikrozoner. Tætte strå, krat og slyngplanter giver mulighed for hurtige flugtveje og effektive skjul. Arten ses ofte i miljøer påvirket af menneskelig aktivitet som rismarker, plantager og vejkantervegetation, hvor fugt og insekter er rigelige. Naturlige vandløb og fugtige lavninger spiller en rolle som klima-regulerende elementer og tiltrækker byttedyr.

Fakta

Det er en lille og slank firben art, som normalt måler 15–25 cm i alt, hvor halen udgør størstedelen af længden. Den er stærkt specialiseret til et liv i tæt vegetation og bruger sin usædvanligt lange hale til balance ved hurtige retningsskift. Arten har fremragende syn og reagerer på selv små bevægelser i omgivelserne, hvilket gør den til en effektiv visuelt styret jæger. Den lange hale bruges ikke kun til balance, men kan også smides ved fare og regenereres langsomt. Arten har kort fordøjelsestid og høj jagtaktivitet, hvilket giver en næsten konstant søgen efter føde i de lyse timer. Det er generelt en fredelig art, men hanner kan udvise mild dominans i yngletiden.

Terrariet

Et terrarie på minimum 60×45×60 cm anbefales til en lille gruppe. Indretningen skal efterligne tæt græs- og buskvegetation med mange vandrette og diagonale klatreruter. Brug planter med smalle, stive blade som Cyperus, Carex, Dracaena marginata, samt tættere grønne planter som guldranke, Ficus pumila, Philodendron scandens og mindre bregner. Disse giver både skjul og naturlige udsigts- og solpladser. Tilføj et rigt netværk af grene, tynde bambusrør, korkstykker og tørrede græs- eller sivbundter, så dyrene frit kan bevæge sig mellem niveauer. Brede blade tæt på varmezoner giver gode solpunkter, mens tætte bundplanter giver tryghed ved flugt. Underlaget kan være en blanding af kokos humus, jord, bark og blade, der holder fugt uden at blive vådt. En struktureret bagvæg øger aktivitetsniveauet og giver flere ruter gennem terrariet. God ventilation er vigtig, men fugten skal stadig holdes stabil i de lavere lag. Flere skjul i både bund, midte og top reducerer stress og gør gruppehold mere stabilt.

Vand & foder

Arten drikker primært fra blade efter forstøvning, så regelmæssig forstøvning er nødvendig. En lav vandskål bør dog inkluderes som supplement. Foderet bør bestå af små levende insekter som fårekylinger, små kakerlakker, græshopper, bananfluer og voksmøllarver som godbidder. Variation er vigtig for sundhed. Foderet vendes i calcium og gives ved de fleste fodringer, mens multivitamin bruges 1–2 gange ugentligt. Dyrene er aktive jægere og trives bedst med livligt, varieret bytte fremfor stillestående foder.

Lys, varme & fugt

Et godt belyst terrarie, gerne med UVB er en god ide for at sikre korrekt optag af D3-vitamin og naturlig aktivitet. Temperaturen bør ligge på 23–27°C med en solplads på 32–34°C. Nattetemperaturen kan falde til 20–22°C. Fugtigheden bør holdes på 60–80%, med højere niveauer om morgenen og delvis udtørring midt på dagen. Terrariet skal have både solrige åbne zoner og tætte, skyggefulde områder. Luftcirkulationen skal være god, men uden at fjerne fugten for hurtigt.

Aktivitet

Arten er meget aktiv i dagslys og bevæger sig hurtigt mellem blade, græs og grene. Den soler sig ofte om morgenen og jager derefter aktivt gennem terrariet. Gruppestruktur fungerer godt ved passende plads og mange skjul. Hanner kan vise mild rivalisering, men alvorlig aggression er sjælden. Aktiviteten øges markant i et tæt, levende terrarie med mange flugtmuligheder og skjul.