



Smaragd træskink

Slægt: Lamprolepis
Art: Lamprolepis smaragdina
Levealder: 6 – 10 år

Levesteder

Lamprolepis smaragdina er udbredt i Sydøstasien, særligt i Indonesien, Filippinerne og Papua Ny Guinea, hvor den lever i fugtige lavlandsområder med tæt tropisk beplantning. Den forekommer i skovkanter, mangrovebælter og kystnære skovområder, hvor lys trænger ned gennem trækronerne og skaber varme zoner i højden. Arten udnytter især områder med stabile temperaturer, høj luftfugtighed og jævn nedbør, som tilsammen danner et klima med små årstidsvariationer. Den finder optimale forhold i øvre vegetationslag, hvor sammenhængende grene, slyngplanter og store blade giver sikre ruter og gode udkigsposter.

Fakta

Det er en smaragdgrøn skink på 25–30 cm, hvor halen udgør størstedelen af længden og bruges aktivt som balancepunkt. Den intense grønne farve kan variere fra lime til dyb smaragd og kombineres ofte med diskrete gyldne nuancer på hoved og sider, hvilket giver camouflage i solftrerede blade. Arten er atletisk og kan bevæge sig hurtigt mellem grene ved hjælp af stærke lemmer og fleksibel krop. I naturen kan individer danne løse, ikke-permanente grupper omkring gode fødeområder, og hanner kan udvise kortvarig dominansadfærd i parringssæsonen gennem kropsløft og farveforstærkning.

Terrariet

Et højt og rummeligt terrarie er nødvendigt, minimum 60×45×90 cm til et par eller lille gruppe. Indretningen skal efterligne tæt tropisk vegetation og give masser af langstrakte, solrige klatreflader. Brug levende planter som Ficus benjamina, Schefflera, Epipremnum aureum, Philodendron scandens, Hoya-arter og store bregner. Planterne giver både skjul, fugtregulering og naturlige hvilepladser. Grene i forskellige tykkelser, bambusrør, korkrør og klatrevægge bør opstilles i skrå og lodrette retninger, så dyrene har ruter gennem hele terrariet.

En bred bagvæg med struktur øger aktiviteten og giver stabile solpunkter. Underlaget kan være en fugtbevarende blanding af kokos, bark, sphagnum og blade, som hjælper med at opretholde tropisk fugtighed uden at blive vådt. Store blade fra Scindapsus eller Monstera kan bruges som hvile- og skjulesteder i mellemhøjde. Flere skjul i både top, midte og bund mindsker stress og giver flugtmuligheder ved gruppehold. En forstøvning morgen og aften skaber den fugtige skovstemning arten kræver.

Vand & foder

Arten drikker hovedsageligt fra blade og glatte overflader efter forstøvning. En lav vandskål bør dog inkluderes som supplement, men bruges sjældent. Foderet bør bestå af små til mellemstore insekter som fårekylinger, græshopper, kakerlakker, voksmøllarver og soldaterfluelarver. Byttet skal være livligt og i passende størrelse. Foderet vendes i calcium og gives ved de fleste fodringer, mens multivitamin bruges 1–2 gange ugentligt. Dyrene er aktive jægere og trives bedst med livligt, varieret foder.

Lys, varme & fugt

Arten kræver UVB og godt dagslys for at sikre korrekt stofskifte og adfærd. Temperaturen bør ligge på 24–29°C med en solplads på 32–35°C. Nattetemperaturen kan falde til 20–24°C. Fugtigheden skal være 60–80%, med daglig forstøvning for at sikre naturlig døgnvariation. Terrariet skal have både lyse solzoner og skyggefulde skjul, så dyrene selv kan regulere varme og lys. Luftcirkulationen skal være stabil, men uden det trækker på dyrene.

Aktivitet

Lamprolepis smaragdina er mest aktiv i den lyse del af dagen, hvor den soler sig, jager og viser hurtig, klatrende adfærd. Den udnytter hele terrariets højde og bevæger sig mellem solpunkter og skjul. Hanner kan vise mild territorieadfærd, men arten kan ofte gå i mindre grupper, hvis plads og skjul er tilstrækkelige. Aktiviteten øges markant i et tæt, højt og beplantet terrarie.