



Tornet blomsterknæler

Slægt: Pseudocreobotra
Art: Pseudocreobotra wahlbergi
Levealder: 1-1,5 år

Levesteder

Tornet blomsterknæler stammer fra Afrika, hvor den lever i tørre og semi-tropiske områder med rigelig vegetation. Den findes ofte på blomster og buske, hvor den camouflerer sig som en del af plantens struktur for at undgå rovdyr og lokke bytte. Habitatet har varme temperaturer på 24-30°C om dagen og køligere nætter. Arten trives bedst i miljøer med moderat fugtighed og masser af sollys. Dens naturlige omgivelser inkluderer åbne områder og skovbryn, hvor den kan finde blomstrende planter.

Fakta

Tornet blomsterknæler er en lille knælerart, hvor hunner bliver op til 5 cm og hanner omkring 4 cm. Den har et unikt udseende med torne på kroppen og et bladmønster på vingerne, der ligner en blomst. Arten er dagaktiv og en dygtig jæger, der bruger sin camouflasje til at lokke bytte tæt på. Hunner er typisk større og mere robuste end hannerne. Under parring kan hunnen i sjældne tilfælde spise hannen, især hvis hun er sulten.

Terrariet

Terrariet skal være højt for at imødekomme knælerens klatrebehov og flyveevne. Et terrarium på mindst 20x20x30 cm (LxBxH) anbefales for én voksen knæler. For større individer kræves et større terrarium.

Knælere er solitære og bør holdes alene for at undgå aggression.

Indret terrariet med grene, blomsterlignende dekorationer og levende planter som orkidéer eller bregner for at efterligne dens naturlige habitat. Toppen af terrariet skal være dækket af net eller have klatrematerialer, da knæleren ofte hænger nedad under hamskifte. Bundlaget kan bestå af kokosfibre eller ugødet jord, som hjælper med at opretholde fugtigheden. Sørg for god ventilation for at forhindre skimmel.

Vand & foder

Tornet blomsterknæler får væske fra sin føde og fra dråber på terrariets overflader. Forstøv terrariet let 1-2 gange dagligt for at sikre adgang til vand, men undgå overfugtning.

Fodringen består af levende insekter som fluer, fårekylinger, små græshopper og voksmøl. Byttedyrene skal være passende i størrelse, så de ikke overstiger knælerens egen kropslængde. Voksne fodres hver 2.-3. dag, mens unge knælere bør fodres dagligt. Sørg for variation i kosten for at sikre korrekt ernæring. Fjern eventuelle overskydende byttedyr, da de kan stresser knæleren.

Lys, varme & fugt

Tornet blomsterknæler kræver ikke UVB-lys, men LED-lys kan bruges til at simulere en naturlig lyscyklus. En lysperiode på 10-12 timer om dagen anbefales.

Temperaturen i terrariet skal holdes mellem 24-28°C, men knæleren kan tåle kortvarige udsving. Om natten kan temperaturen falde til 18-20°C. Luftfugtigheden skal være mellem 60-80%, hvilket opnås gennem daglig forstøvning. Brug evt. et termometer og hygrometer for at overvåge forholdene i terrariet.

Aktivitet

Tornet blomsterknæler er primært dagaktiv og bruger meget tid på at sidde stille og vente på bytte. Den er kendt for sin fascinerende jagtadfærd, hvor den udnytter sin blomstercamouflasje til at lokke bytte tættere på. Knæleren er nysgerrig og vil ofte reagere på bevægelser i nærheden af terrariet. Under hamskifte kræver den ro og stabile forhold for at sikre en succesfuld proces.